For Mr Cann
with compts from the
Author

DISSERTATIO MEDICA,

INAUGURALIS,

DE

Asthmate Spasmodico.

BRITISH MUSEUM

14

DISSERTATIO MEDICA, INAUGURALIS, DE Asthmate Spasmodico.

QUAM,

ANNUENTE SUMMO NUMINE,

Ex Auctoritate Reverendi admodum Viri,

D. GULIELMI ROBERTSON, S. S. T. P.

ACADEMIÆ EDINBURGENÆ PRÆFECTI;

NEC NON

Amplissimi SENATUS ACADEMICI consensu,

Et nobilissimae FACULTATIS MEDICÆ decreto;

PRO GRADU DOCTORATUS,

SUMMISQUE IN MEDICINA HONORIBUS ET PRIVILEGIIS RITE ET LEGITIME CONSEQUENDIS;

Eruditorum examini subjicit

JACOBUS FENWICK,

ANGLUS,

Soc. Reg. Med. Edin. Sod.

Ad diem 25. Junii, hora locoque solitis.

EDINBURGI:

Apud BALFOUR et SMELLIE,

Academiae Typographos.

M,DCC,LXXXI.

DISSERTATIO MEDICA,

INAUGURALIS,

DE

Asthmate Spasmodico.

WELLCOME INSTITUTE LIBRARY MUSEUM

DISSERTATIO MEDICA,

INAUGURALIS,

DE

Asthmate Spasmodico.

IN hacce dissertatione inaugurali de Asthmate, ut a celeb. viris Culleno et Floyero definito et descripto, tractare in proposito est. Praetermisso igitur procœmio, symptomatum historiam ex ipsis fere Floyeri verbis prosequemur. Nec enim quid aliud a tyrone, de morbo quovis tractante, expectari arbitror, nisi ut utilissima quaeque, et fide dignissima, ex virorum illustrium scriptis seligat. Felicissimum me igitur fatebor si hoc praestiterim.

Per

Per diem ante paroxyſmi aggreſſum, laſſitudine, torpore generali, ad praecordia moleſtiae ſenſu, tentatur aeger; caput etiam gravedine et dolore (levi forſan) afficitur. Circa horam quartam veſpertinam, anguſtiae ſenſus ad ſcrobiculum cordis urget, et ventriculus ructibus et flatibus ſimul laborat. Capitis dolores, et gravedo intenduntur, quos ſimul pandiculatio, ſomnolentia, oſcitatio comitantur; pulmones rigent; reſpiratio difficilior, tardior, et ſibilans quodammodo fit; vox ſimul irrauceſcit; tuſſicula convulſiva adeſt; ſputa vero parce exſcreantur; urina palida et copioſa eſt; calor obſcurus, ſitis, fauciumque ſiccitas, plus minuſve aegrum ſemper urgent. Calor lecti, et ſtragula poſt decubitum in pectus gravitantia, ſymptomata augent. Sed per ſomnum plerumque dolores remittuntur.

Sub horam ſecundam, tertiam, vel quartam matutinam, ſubito e ſomno, cum intolerabili ſuffocationis, et ad thoracem conſtrictionis

ſtrictionis ſenſu, aegri excitantur; reſpiratio tarda, laborioſa, difficillima, cum ſibilo fit, nec niſi corpore erecto, aëreque frigido accedente, reſpirare queunt; hinc ad feneſtras apertas, pro ſolatio, ſaepe confugiunt; cervix erigitur; humeri coſtaeque elevantur; nares dilatantur, ad reſpirationem faciliorem reddendam; labia contrahuntur; tuſſis, exſcreatio, loquela, iis perquam difficilia ſunt; facies turgida et rubra, vel lurida, et tandem nigra devenit; oculi prominent, et lacrymas effundunt; ventriculus vehementius flatibus diſtenditur, et aliquando bilis flava vel viridis ejicitur; alvus plerumque ſemel biſve dejicit; interdum autem pertinaciter adſtricta eſt; calor intenſus et urens adeſt; et ſudores aliquando profluunt; pulſus parvus, ſimulque celer et inaequalis eſt; artus, maxime vero manus et pedes, pallent et frigent; muſculi laxantur; omnis fere membrorum motus perit; vires proſternuntur; et, ſi omnia in pejus ruunt, ſudores frigidi, palpitatio cordis vehemens, delirium

lirium ferox, et deliquium animi, morten
afferunt. Plerumque vero, cum per aliquo
temporis ſymptomata duraverint, ſenſim re
mittuntur; reſpiratio liberior fit; calor natu-
ralis totum corpus pervadit; et denique ſudo
modicus profluit; ſputa dulcia, vel ſubſalſa
plerumque cum filamentis ſanguineis mixta
exſcreantur; urina rubra fit, et ſedimen-
tum lateritium deponit. Haec omnia, in
unoquoque paroxyſmo, minime occurrunt
et raro quidem delirium ferox, deliquium
animi, et alia illa ſigna adeo periculoſa
obſervantur. Si alvus, ſub paroxyſmi ini-
tium, ſemel biſve dejicit, ſtatim plerumque
ſymptomata levantur, et breviore tempore
paroxyſmus ſolvitur, vel ſubito nonnun-
quam decedet. Per aliquot horas paroxyſ-
mi durare ſolent; per dies tres, quatuor, vel
quinque eorundem recurſus. Intervallum
vero ad dies plurimos, ſeptimanas, vel
menſes protrahitur; ſed in his variationes
tam innumerabiles ac frequentes ſunt, ut
nihil certe neque de recurſu, neque de du-
ratione paroxyſmorum dicendum eſt.

CAUSÆ

CAUSÆ OCCASIONALES.

Cum cognitio cauſarum occaſionalium ad praediſponentis inveſtigationem utilis ſit, de iis primum dicendum erit. Inter has, tempus humidum pluvioſum, ſubitae mutationes a tempeſtate ſerena ad humidam, et calor intenſus, maxime frequentes ſunt. Frigus etiam inter cauſas occaſionales ab Hoffmanno numeratur, ex eo quod aſthmaticos nonnullos aeſtate, quam hyeme, ſaniores obſervaverit: Detractio ſanguinis copioſa et repetita; purgantia, et emetica fortiora; aliaeque evacuationes nimiae; ebrietas; crapula; venus nimis culta; potus tepidi; cibi omnes aëre fixo abundantes, vel qui difficiles concoctu ſunt; aër vaporibus acribus, ut fumis tabacci, metallorum, ſulphuris, aliorumque ſtimulantium, repletus; animi affectiones inordinatae, quales

ſunt, timor, vel ira; nimia ſtudiis applicatio, lucubrationeſque nocturnae; exercitatio juſto violentior; haemorrhoidum, menſium, aliarumque evacuationum ſuppreſſio; febres maxime intermittentes, hyſteria, hypochondriaſis, podagra retropulſa, catarrhus, peripneumonia; haec omnia inter hujus morbi cauſas enumerantur; multaeque aliae ab auctoribus numeratae ſunt, quae hoc loco ſilentio praeteribimus.

CAUSA PRÆDISPONENS.

Huic morbo maxime favet (teſtantibus fere omnibus) temperamentum ſanguineum, irritabilitate ſimul et debilitate conjunctum. Sed ſunt inter aſthmaticos, qui corpore firmo et bene formato gaudent, qui nullis affectionibus aliis nervoſi generis obnoxii ſunt,

ſunt, et in quibus morbus omnino localis eſſe videtur. Ex hiſce igitur obſervationibus, morbum pendere a textura vel fabrica quadam pulmonum crederem. Cum temperamento forſan haeredetarius eſt, ſed aliquid ſimul et pulmonum compagi tribuendum.

CAUSA PROXIMA.

Multa ſuadent aſthma ex colluvie ſeroſa non orire. Aſthmatis paroxyſmus ſemper fere mitigatur, antequam mucus exſcreatur; hinc mucum abundantem, potius effectum, quam cauſam, paroxyſmi judicarem: Secretio muci ex quavis cauſa aucta, vaſa bronchialia irritando, contractionem ſpaſmodicam inducere poteſt; hinc potius pro cauſa occaſionali, quam proxima, haberi

haberi debet. Eaedem fere aſthmatis ſicci, ac humidi, cauſae recenſentur; eademque in utroque adhibentur medendi conſilia: Sola muci ſecretione inter ſe diſcrepant; ſiccum porro in humidum haud raro immutatur; ad idem igitur morbi genus omnino referenda videntur. Omnes fere hujus morbi cauſae ſunt, vel quae debilitatem ſimul et irritabilitatem inducere poſſint, quales ſunt omnes evacuationes nimiae, vel quae in habitu debili ac irritabili morbum ſuo ſtimulo excitant, quales ſunt fumi tabacci, ſulphuris, levis mentis emotio, &c. Debiles ſpaſmis prae aliis hominibus obnoxii ſunt. Eaedem fere ſunt cauſae aſthmatis ac aliorum morborum ſpaſmodicorum. Aſthmatis paroxyſmus ſubito invadit, et pariter ſubito decedere nonnunquam obſervatur. Ex cunctis proinde facile creditu eſt, aſthma a conſtrictione ſpaſmodica bronchiorum eſſe prognatum. Monebam ſupra, inter aſthmaticos eſſe, qui corpore firmo ſtabilique gauderent.

derent. Exinde quaeri ideo poteſt, an morbum in iis ex eadem cauſa produci crederem? Nonne morboſa ſenſibilitas vel irritabilitas in pulmone ineſſe poteſt, qua facilius in contractionem cieatur, dum in omnibus aliis partibus corpus firmum robuſtumque ſit?

DIAGNOSIS.

Definitio aſthmatis, ni fallor, pro diagnoſi haud inepte inſtitui poteſt; nec certius, aut melius, quis morbus ab alio diſtinguitur, quam definitione ſymptomata ei peculiaria, et pathognomonica dicta, complectente. Verbis ſquentibus cel. noſtro Culleno definitur, " Spirandi difficultas per intervalla ſubiens; cum anguſtiae in pectore ſenſu, et reſpiratione cum ſibilo ſtrepente; tuſſis ſub initio paroxyſmi difficilis, vel nulla,

la, verſus finem libera, cum ſputo muci ſaepe copioſo."

PROGNOSIS.

Quanquam ex concurſu ſymptomatum aegros ſummo in periculo verſari judicaremus, conſtitit tamen multos, per plures annos, hoc morbo laboraſſe; nonnullos etiam ad vitae munera, ſine ullo fere incommodo, valuiſſe. Curatio tamen in juvenibus perdifficilis, in ſenibus fere impoſſibilis eſſe, apud medicos huc uſque habita eſt; neque profecto immerito: Quo recentior fuerit morbus, eo melior curationis ſpes, et vice verſa. Si a labe haereditaria pendeat (teſtante Floyero) medelam non admittit. Quo frequentiores paroxyſmi, et violentiores, eo majus periculi adeſſe conſtat. Si a podagra retropulſa ortum fuerit aſthma, idoneis remediis haec ad pedes iterum reducta,

ducta, paroxyſmum aſthmaticum haud raro ſolvit; cachexia, pedum tumores, hydrops pectoris, vel generalis, macies, phthiſis, vertigo, lethargia, apoplexia, paralyſis, ſyncope frequens, et cordis palpitationes, delirium ferox, ac deliquium animi, peſſimi ſunt ominis, mortemque adeſſe demonſtrant.

METHODUS MEDENDI.

Indicationes curatoriae in hoc morbo ſunt, 1mo, In paroxyſmo ſpaſmum tollere; 2do, Ipſius regreſſui obviam ire. De his ordine tractandum eſt.

Aſthma nunquam (teſtante Floyero) ſanguinis detractione ſanatur; et ſi ſaepius educatur ſanguis, metus haud inanis erit, ne per tabem, cachexiam, alioſve hujuſmodi morbos, aegri miſerrime pereant. Nunquam

quam igitur, niſi urgente ſuffocatione, ſanguis detrahi debet. Epiſpaſtica thoraci applicata dyſpnoeam in paroxyſmo augent, quippe quae ipſius dilatationem impediant: Sed forſan epiſpaſtica inter ſcapulas applicata, iſto incommodo carebunt. Cathartica fortiora ſemper nocent; mitiora, praecipue vero enemata, utiliſſima judicantur remedia. Emetica etiam leniora a Floyero aliiſque multum laudantur. Si ex capitis quodam dolore, ex oppreſſione circa ſcrobiculum cordis, et aliis hujuſmodi ſymptomatis, paroxyſmum nocte ſubſequente expectare liceat, optime adhibentur gr. vii. vel viii. ipec. inſigne levamen haud raro allatura. Expectorantia oleoſa et mucilaginoſa ventriculum opprimunt; hinc malum potius augere, quam levare, crederem. Fugiendus eſt calor externus. Medicis celebrantur nitrum, ſal ammon. multaque alia, tam acida, quam media, quae omnia ſilentio praeteribimus. Caſtor, ſp. aether. vitr. opium, moſch. aliaque hujus generis

generis antiſpaſmodica reliquis quibuſvis medicamentis, mihi anteferenda videntur. Quibuſdam forſan plethoricis nocerent iſta; plerumque vero (ſi fides experimentis danda ſit) periculo vacare certum eſt. Opium ſolutioni paroxyſmi feliciſſime inſervire, teſtatur Floyerus.

Nunc de iis quae ad ſecundam indicationem pertinent. Cum morbus a debilitate, ſimul et irritabilitate, oriri videatur, noſtrum erit ea adhibere remedia, quae ad vires reſtaurandas conveniant. Inter haec praecipua ſunt cort. Peruv. et metallica quaedam; quae omnia, quibuſdam aſthmaticis, plethoricis ſcilicet, nocere non ignoro. Cortex tamen, infuſi vel decocti forma, ſimul additis aromaticis, vel acido vitriolico, ventriculo gratior, quam ſub pulveris vel alii cujuſvis ſolidi ſpecie, ſit; et tum in aſthmate ſpaſmodico feliciſſime adminiſtratur. Balneum frigidum, ni vetet plethora, perutile eſt. Si unquam fonti-

culi vel ſetacea in hoc morbo juvent, plethoricis maxime, et iis qui evacuationibus ſuppreſſis laborant, conveniunt. Alvus laxa ſervanda eſt. Lucubrationes, praecipue nocturnae, violenti animi affectus, ceteraeque cauſae occaſionales, ſedulo vitandae ſunt. Multum ab aëre pendet, qui, quo purior eſt, eo aſthmaticis minus nocet; craſſior vero quibuſdam magis convenit. Aſthmaticis nunquam contemnenda eſt exercitatio, ſine qua omnia medicamenta erunt fere inutilia; exercitationibus autem ſtrictius ſic dictis, variae geſtationes, veluti equitatio, navigatio, vectio in curru, fere anteponenda ſunt. Cibus animalis ſemel de die ſumendus, levis ſimul, et qui multum nutrimenti praebeat, imprimis quaerendus: Fugienda omnia quae flatum procreant. Multum nocent potus tepidi, thea, coffea, &c. Utiliſſima erunt vinum rubrum, albumque Hiſpalenſe, parca quantitate, aſſumpta.

FINIS.

BIBLIOTECA MUSEUM